

# IBUPROFENO DRAWER

## 400 mg Inyectable

Venta bajo receta  
Industria Argentina

### FORMULA

Cada ampolla contiene:

Ibuprofeno (como lisinato).....	400 mg
Clorhidrato de lidocaína .....	30 mg
Agua para inyectables c.s.p. ....	3 ml

### ACCION TERAPEUTICA

Analgésico, antipirético, antiinflamatorio.

### INDICACIONES

Procesos inflamatorios, dolores agudos (cefaleas, jaquecas, ciática), traumatismos, gota, mialgias, odontalgias, dolores crónicos (artrosis, lumbalgias).

### POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Ibuprofeno 400 mg inyectable: 1 ampolla por vía intramuscular cada seis a ocho horas.

### ADVERTENCIA DE USO

**El ibuprofeno inyectado intramuscularmente puede producir una necrosis de la zona. Se ha descrito un síndrome denominado Nicolau cuando al colocar una inyección intramuscular se produce una lesión lúvica, necrótica con diversos tipos de medicamentos probablemente ligada a la inyección en arteriolas del sitio de inyección.**

**El Sistema Nacional de Farmacovigilancia ha recibido una cantidad de notificaciones de pacientes con lesiones necróticas en muslo y brazo luego de la inyección de ibuprofeno. Deberá administrarse cuidando la no inyección en sangre y muy lentamente.**

### PRECAUCIONES

Puede producir somnolencia. Debe evitarse las bebidas alcohólicas.

#### Reproducción / embarazo

Pese a que no se han hecho estudios adecuados y bien controlados en humanos, los estudios en animales han mostrado que causa efectos adversos sobre el desarrollo fetal.

#### Lactancia

Los estudios en humanos no han detectado ibuprofeno en la leche materna usando métodos capaces de detectar la medicación en una concentración 1mcg/ml. La dosis de la madre fue de 400 mg cuatro veces al día.

#### Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados

Los pacientes intolerantes a una droga antiinflamatoria no esteroide, puede serlo a otras.

Puede causar broncoconstricción o anafilaxia en asmáticos sensibles a la aspirina, especialmente aquellos con la triada de aspirina, intolerancia, asma y pólipos nasales.

#### Geriatría

Los pacientes geriátricos pueden tener mayor tendencia a desarrollar toxicidad gastrointestinal, hepática o renal debido a que la función renal disminuida produce acumulación de la medicación. Algunos médicos recomiendan que los pacientes geriátricos especialmente aquellos de 79 años o mas, recibirán inicialmente la mitad de la dosis de adultos.

#### Pediatría

Pese a que no se han hecho estudios adecuados, bien controlados y de largo alcance, no han sido documentados problemas en niños.

#### Dental

Puede causar dolor, irritación o ulceración de la mucosa oral.

### INTERACCION CON LAS DROGAS

Acetaminofeno, adrenocorticoides, glucocorticoides o alcohol o corticotropina o con suplementos de potasio, aminoglucosidos o glucosidos digitálicos, anticoagulantes derivados de cumarina o de indandiona, o heparina o agentes antidiabéticos orales o insulina, antihipertensivos o diuréticos, especialmente triamtereno, dos o más analgésicos antiinflamatorios concurrentes, especialmente

diflunisal o indometacina o salicatos, especialmente aspirina, otras medicaciones causantes de disgracia sanguínea, clepesores de la médula ósea, terapia radiactiva, cefamandol o cefoperazona o cefotetan o moxalactan o plicamicina colchicina, compuesto de oro, litic, metotrexato, otras medicaciones nefrotóxicas o veraparnillo, otras medicaciones fotosensibilizantes, otros inhibidores de la agregación plaquetaria prebenecida.

#### **ACCIONES COLATERALES**

Picazón en la piel, retención de fluidos, zumbido en los oídos, salpullido, calambres, dolores o molestias leves o moderados, en abdomen o estómago, o sensación de hinchazón o gas o indigestión o náuseas o vómitos (irritación gastrointestinal), constipación, disminución o pérdida de apetito, diarrea, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza leve o moderado, nerviosismo o irritabilidad.

#### **TRATAMIENTOS DE EFECTOS ADVERSOS O SOBREDOSIS**

Monitoreo y soporte de las funciones vitales. Tratamiento sintomático de soporte. Puede ser útil inducir la diuresis. Pueden ser necesarios aumentadores del volumen de plasma para hipotensión severa, diazepam para convulsiones, vitamina K para hipoprotrombinimia y/o dopamina más dobutamina, para prevenir o revertir las indicaciones anticipadas de falla renal.

#### **PRESENTACION**

Envases conteniendo 100 ampollas por 3 ml para uso hospitalario exclusivo.

#### **CONSERVACION**

A temperatura ambiente.

"Mantener fuera del alcance de los niños"

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires  
Certificado N°: 25757

Director Técnico: Alejandro Néstor Bovetti - Farmacéutico

Elaborado por: Laboratorio DRAWER S.A.  
Dorrego 127 Quilmes. Buenos Aires. Argentina.

"Para circulación y comercialización exclusiva en la provincia de Buenos Aires".

